



®
Н
О
Т
И
П
С

Крупный охотник за сорняками

ГЕРБИЦИД

пропизохлор, 720 г/л

- Широкий спектр действия
- Гибкость в сроках применения (до всходов или в ранние фазы развития культуры)
- Период защитного действия до 60 дней
- Хорошая совместимость с другими гербицидами
- Отсутствие ограничений по севообороту

Питон® – почвенный гербицид против однолетних злаковых и некоторых двудольных сорняков на посевах пропашных, рапса и сои

Препарат выпускается в форме концентрата эмульсии.

Чувствительны к Питону®: ежовник обыкновенный, щетинник мутовчатый, росичка кроваво-красная, мятлик однолетний, просо сорное, просо волосовидное, сорго алеппское, гумай, лисохвост мышехвостиковидный, щирица (виды) и др.

Умеренно чувствительны: марь белая, паслен черный, горец почечуйный, пастушья сумка обыкновенная, ромашка (виды), подмаренник цепкий и др.

Пропризоклор ингибирует биосинтез белка, обладает системным действием. Проникает в сорняки через побеги и корневую систему, быстро уничтожая их. Создает гербицидный «экран» в поверхностном слое почвы, контролирует новые всходы засорителей.

Гербицид воздействует на чувствительные к нему растения на ранних стадиях прорастания, предотвращает появление сорняков на поверхности почвы.

На эффективность препарата влияют условия увлажнения: при засухе эффективность может снижаться, а защитный период – укорачиваться.

Однократное применение Питона® обеспечивает чистоту посевов на срок **60 – 80 дней** (в основном в течение всего вегетационного периода), в зависимости от климатических и иных факторов.

Важно!

Не допускается добавлять воду в препарат и смывать его водой из предбака. Препарат рекомендуется вводить непосредственно в бак опрыскивателя при условии хорошо работающей гидравлической мешалки.

Питон® совместим с гербицидами на основе мезотриона, изоксафлютола, тербутилазина, сульфонилмочевин, десмедифама, этофумезата и фенмедимафама, метамитрона, ленацила, кломазона, флумиоксазина.

Перед применением баковой смеси нужно провести проверку ее компонентов на совместимость.



Расход рабочей жидкости, л/га

200 – 300

Упаковка

Канистры по 10 л

Культура	Норма расхода препарата, л/га	Способ и сроки обработки
Кукуруза, подсолнечник, рапс яровой, рапс озимый, свекла сахарная, соя	2 – 3	Опрыскивание почвы до всходов культуры
Кукуруза, свекла сахарная, рапс озимый	2,5 – 3	Опрыскивание вегетирующих растений в фазе от 2 до 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков
Соя	3	

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

С нами расти легче

avgust 
crop protection

avgust.com ул. Цандера, д. 6, Москва, 129515. +7 495 787-08-00