



ДАСТ ТОП



Сотри овсюг с поля!

ГЕРБИЦИД

феноксапроп-П-этил,
90 г/л + клодинафоп-
пропаргил, 60 г/л + антидот
клоквинтосет-мексил, 40 г/л

- Высокая эффективность одновременно против овсюга и видов проса
- Полная селективность к растениям культуры
- Применение независимо от фазы развития культуры
- Экономичное и эффективное решение проблем со злаковой засоренностью

Ластик® Топ – селективный системный гербицид против однолетних злаковых сорняков в посевах пшеницы

Препарат выпускается в форме масляного концентрата эмульсии.

Ластик® Топ уничтожает однолетние злаковые сорняки – овсюг (виды), плевел (виды), просо (виды), метлица (виды), лисохвост мышехвостниковидный, мятлик (виды), щетинник (виды), росичку кроваво-красную и др.


Гербицид обладает системным действием, проникает в сорные растения через листья и распространяется по ним, накапливаясь в точках роста. Антidot ускоряет процесс специфической детоксикации действующих веществ в культурных растениях.

Уже через сутки после обработки сорняки перестают конкурировать с культурой, в течение первой недели проявляются симптомы гербицидного действия. Гибель сорных растений наступает в течение 2 – 4 недель, в зависимости от ряда факторов. Максимально быстрый эффект достигается при обработке в ранние фазы развития сорняков и при условиях, оптимальных для их роста. На появившиеся позднее, уже после опрыскивания, сорняки гербицид не действует, однако они уже не опасны для раскутившихся зерновых культур.

Рекомендовано однократное применение Ластика® Топ в фазы 2 - 3 листа – кущение сорняков независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Очень важно правильно выбрать срок применения гербицида – массовое появление однолетних злаковых сорных растений. Важно также, чтобы их не «экранировали» растения культуры. На озимой пшенице препарат применяют весной. Рекомендуется добавление в рабочий раствор препарата адьюванта Галоп®.

Препарат совместим с гербицидами на основе клопиралида, феноксикислот, сульфонилмочевин, а также со многими инсектицидами и фунгицидами. Нельзя смешивать гербицид с препаратами, имеющими щелочную реакцию.

В случае смешивания препарата с гербицидами на основе 2,4-Д при неблагоприятных для обработки условиях и особенно против переросших сорняков рекомендуется использование максимальных зарегистрированных норм расхода граминицида.



Расход рабочей жидкости, л/га

Наземная обработка – 50 – 200

Авиаприменение – 25 – 50

Упаковка

Канистры по 5 и 10 л

| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Способ и сроки обработки |
|-------------------------|-------------------------------|--|
| Пшеница яровая и озимая | 0,4 - 0,5 0,4 - 0,5 (А) | Наземное или авиационное опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорнякам (2 - 3 листа – конец кущения) независимо от фазы развития культуры. Озимую пшеницу обрабатывают весной |

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

С нами расти легче

avgust crop protection