

КЕХТАВР®



Пшенице – да, сорным злакам – нет!

ГЕРБИЦИД

флукарбазон натрия,
700 г/кг

- Быстрое действие и высокая эффективность против широкого спектра однолетних злаковых сорняков
- Сдерживание некоторых многолетних злаковых и двудольных сорняков
- Почвенное действие на новые всходы сорняков
- Высокая селективность к культуре

Кентавр® – селективный гербицид против однолетних и некоторых многолетних злаковых, а также некоторых двудольных сорняков в посевах пшеницы

Препарат выпускается в форме водно-диспергируемых гранул.

Кентавр® уничтожает многие виды однолетних злаковых сорняков, в числе которых: метлица (виды), овсюг, щетинник (виды). Также препарат подавляет костер японский и ржаной, райграс. В испытаниях препарат проявил эффективность против пырея ползучего, останавливая сорняк в росте и не давая ему образовать семена.

Из двудольных сорняков Кентавр® контролирует такие виды, как горчица полевая, ярутка полевая, редька дикая, пастушья сумка, гулявник Лезеля, дескурайния Софии и др. Кроме того, препарат подавляет щирицу запрокинутую, горец вьюнковый, подмаренник цепкий, неслюю метельчатую, пикульник обыкновенный, курай обыкновенный, коноплю сорную, липучку оттопыренную и др.

Гербицид действует на сорняки через почву и листья. За счет передвижения по флоэме и ксилеме он распределяется по всему растению. Поглощаясь проростками сорняков, останавливает их рост.

Первые симптомы действия Кентавра® (пожелтение и побеление листьев сорняков) можно наблюдать через 3 дня после обработки. Полная гибель сорных растений, в зависимости от погодных условий, наступает через 1 – 3 недели. Период защитного действия препарата – до 60 дней.

Гербицид безопасен для пшеницы. Однако иногда в течение недели после применения препарата может наблюдаться изменение окраски листьев пшеницы, которое быстро проходит и не сказывается на величине урожая. В большинстве опытов при использовании Кентавра® задержки развития культурных растений не отмечено.

Самостоятельное применение Кентавра® наиболее эффективно в норме расхода препарата 50 г/га. Применять Кентавр® в минимальной норме расхода от 25 г/га рекомендуется только в смеси с Ластиком® Топ, 0,3 л/га или Ластиком® Экстра, 0,6 – 0,8 л/га.

Для получения наилучшего эффекта к Кентавру® следует добавлять ПАВ Адю® 0,1%-ный раствор, даже при применении в баковых смесях.

Для предотвращения резистентности сорняков к гербициду рекомендуется применять препараты с различным механизмом действия.

Для Кентавра® есть ограничения по севообороту (см. на тарной этикетке, в мобильном приложении компании «Август» или на сайте avgust.com).

Кентавр® совместим с большинством гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, за исключением сильнощелочных препаратов. Препарат можно смешивать с гербицидами на основе сульфонилмочевин и феноксапроп-П-этила, клопиралида, флорасулама, флуороксипира, 2,4-Д. Против злаковых сорняков отличные партнеры для Кентавра® – Ластик® Топ и Ластик® Экстра, против двудольных – Балерина® Форте, Бомба®, НордСтрим®, Балерина® Супер, Балерина®. Кентавр® не совместим с гербицидами на основе дикамбы и МЦПА.



Расход рабочей жидкости, л/га

50 – 300

Упаковка

Банки по 300 г

Культура	Норма расхода препарата, г/га	Способ и сроки применения
Пшеница озимая и яровая	25	Опрыскивание посевов с добавлением ПАВ Адю, 0,1%-ный р-р, начиная с фазы 2 – 3 листьев до конца кущения культуры в ранние фазы роста двудольных сорняков. Озимые обрабатывают весной
	42 – 70	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 2 – 3 листьев до конца кущения культуры в ранние фазы роста двудольных сорняков. Озимые обрабатывают весной

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

С нами расти легче

avgust crop protection

avgust.com ул. Цандера, д. 6, Москва, 129515. +7 495 787-08-00